

初級:問題10

模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ ジュウゾウ 患者 十三		間違井 病院 歯科
年齢	73歳3カ月	男	マチガイ カ 間違井 華 医師
処方	変更 不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。	
		Rp1. 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 3錠 1日3回 毎食後 5日分 Rp2. 【般】アセトアミノフェン錠200mg 2錠 疼痛時 5回分 【以下余白】	
備考			このQRコードを 読み取ることで 問題を印刷でき るサイトへ接続 できます。
	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。		
保険医署名		印	

基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	なし	なし	なし	サバ	-

今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	6日前	35日前
セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg 毎食後 1回1錠	5日分	-	-
アセトアミノフェン錠200mg 疼痛時 1回2錠	5回分	-	-
間違井病院 透析科 間違井無沙杉 医師			
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg 朝食後 1回1錠	-	14日分	30日分
バイアスピリン錠100mg 朝食後 1回1錠	-	14日分	30日分
ランソプラゾールOD錠15mg 朝食後 1回1錠	-	14日分	30日分
ロスバスタチン錠2.5mg 朝食後 1回1錠	-	14日分	30日分
ニフェジピンCR錠20mg 朝食後 1回1錠(非透析日のみ服用)	-	8日分	-
ケトプロフェンテープ40mg 1日1回 腰に貼付	-	63枚	63枚

今回処方の患者の訴え

歯茎に膿が溜まっていて、痛みもあります。抗生物質で様子を見ることになる。降圧薬が増えてから血圧は下がっているのかよく分からない。

前回処方(6日前)の薬歴

S : 透析をしない日の血圧が高く、140くらいある日が多い。
非透析日のみ降圧薬を服用して、しばらく様子を見ることになりました。

O : 継続(前回) + ニフェジピンCR(非透析日のみ): 初回。
BP: 140前後。併用薬なし。残薬あり: リンゼス。

A : ニフェジピンと飲食物の食べ合わせについて

P : グレープフルーツの摂取で効果が上がる恐れがあり、摂取しないこと。

N : 降圧薬追加後、血圧は下がっているか？