

# 中級:問題7

## 模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ チカツナ 患者 親綱		間違井 病院 小児科
年齢	10歳7カ月	男	マチガイ ダロウ 間違井 駄朗 医師
処方	変更不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。	
		Rp1. 【般】カルボシステインシロップ用50% 【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ用1.5% 【般】トラネキサム酸細粒50% 1日3回 毎食後	1.7g 1.7g 1.7g 7日分
		Rp2. 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg 1日1回 就寝前	1錠 14日分
		Rp3. 【般】アセトアミノフェン細粒20% 発熱時	1.5g 5回分
		Rp4. 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 1日2回 朝食後・就寝前	2g 14日分
		【以下余白】	
備考		このQRコードを読み取ることで問題を印刷できるサイトへ接続できます。	
		「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。	
		保険医署名	

## 基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	なし	なし	なし	卵	-

## 今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	25日前	62日前
カルボステインDS50% 毎食後 1回0.57g【混合】	7日分	-	-
アンプロキソール塩酸塩DS1.5% 毎食後 1回0.57g【混合】	7日分	-	-
トラネキサム酸細粒50% 毎食後 1回0.57g【混合】	7日分	-	-
モンテルカストチユアブル錠5mg 就寝前 1回1錠	14日分	30日分	30日分
アセトアミノフェン細粒20% 発熱時 1回1.5g	5回分	-	-
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% 朝食後・就寝前 1回1g	14日分	30日分	30日分
アドエア50エアゾール120吸入用 1日2回 1回1吸入	-	1キット	-
白色ワセリン 1日2回 四肢に塗布	-	-	100g
ロコイド軟膏0.1% 1日2回 腕に塗布	-	-	10g

## 今回処方の患者の訴え

咳が出てきて、喉が腫れている。体重は29kgです。熱は、微熱程度です。アドエアは連日使用するように聞きました。まだ残薬があります。

## 前回処方(25日前)の薬歴

S：咳は落ち着いている。吸入は、調節しながらでも良いと聞きました。  
 O：継続(前回)+アドエア:使用中(調節指示あり)。  
 - 白色ワセリン、ロコイド軟膏:残薬あり。併用薬なし。  
 A：症状安定下におけるアドエアの調節について。  
 P：アドエアは、咳が出ないように予防として吸入するお薬です。  
 調節しながら使用して、悪化してくるようなら連日使用してください。  
 N：アドエア:調節状況は？咳症状経過は？