

DPP 4			
(選択的 DPP-4 阻害)			
AJ) 腎障害により用量調節が必要			
1	ジャヌビア グラクティブ	12.5mg 25mg	50mg 100mg
1	ネシーナ	6.25mg 12.5mg	25mg
1	オングリザ	2.5mg 5mg	5
1-2	エクア	50mg	100
2	スイニー	100mg	400
NM 1	テネリア	20mg 40mg	40
NM 1	トラゼンタ	5mg	5
週1回製剤			
1	ザファテック	25mg 50mg	100mg
1	マリゼブ	12.5mg 25mg	25

DPP 4 + SGLT 2			
スージャヌ配合			
		スーグラ	50mg
朝		ジャヌビア	50mg
カナリア配合			
NM 朝		テネリア	20mg
朝		カナグル	100mg
トラディアンズ配合			
NM 朝		トラゼンタ	5mg
朝		ジャディアンス	10mg
		AP	BP
		トラゼンタ	5mg
		ジャディアンス	10mg

SGLT 2			
(選択的 SGLT 2 阻害)			
SE) 脱水・頻尿 ■ CKD適応あり、■ 心不全適応あり ■ 1型糖尿病適応あり ※数字は用量			
NM 朝	スーグラ	25mg 50mg	100
NM 朝	ルセフィ	2.5mg 5mg	5
NM 朝	デベルザ	20mg	20
NM 朝	カナグル	100mg	100
NM 1	フォシーガ	5mg 10mg	10
NM 朝	ジャディアンス	10mg 25mg	25

グリニド			
(速攻型インスリン分泌促進)			
SE) 低血糖 ※用法は食直前			
RR) SUは併用不可: レセプト査定の恐れ			
RR 3	スターシス ファスティック (ナテグリニド)	30mg 90mg	1回 120
RR 3	グルファスト (ミチグリニド)	5mg 10mg	1回 20
RR 3	シュアポスト (レパグリニド)	0.25mg 0.5mg	1回 1

DPP 4 + TZD			
リオベル配合			
RR 朝		LD	HD
朝	ネシーナ	25mg	25mg
朝	ピオグリタゾン	15mg	30mg

SU + TZD			
ソニアス配合			
RR 朝		LD	HD
朝	グリメピリド	1mg	3mg
朝	ピオグリタゾン	15mg	30mg

グリニド + α-GI			
グルベス配合			
RR 3		ミチグリニド	10mg
3		ボグリボース	0.2mg

DPP 4 + BG			
メトアナ配合			
2		LD	HD
朝	スイニー	100mg	100mg
朝	メトホルミン	250mg	500mg
イニシク配合			
1		ネシーナ	25mg
朝		メトホルミン	500mg
エクメット配合			
2		LD	HD
朝	エクア	50mg	50mg
朝	メトホルミン	250mg	500mg

TZD			
(チアゾリジン)			
RR) 心不全は疾患禁忌: 現病歴の確認又は既往歴 AJ) 高度腎障害は禁忌			
SE) むくみ、C/PK上昇 ※インスリン使用時は上限用量30mg			
禁	アクトス	15mg 30mg	45
RR 朝	(ピオグリタゾン)		

SU			
(スルホニル尿素)			
AJ) 高度腎障害は禁忌			
SE) 低血糖 ■ DPP4/GLP1/SGLT2 併用時、減量推奨量			
禁	アマリール	0.5mg 1mg 3mg	6 2
1-2	(グリメピリド)		
禁	オイグルコン	1.25mg 2.5mg	10 1.25
1-2	(グリベンクラミド)		
禁	グリミクロン	20mg 40mg	160 40
1-2	(グリクラジド)		

α-GI			
(αグルコシダーゼ阻害)			
SE) 腹部膨満感、放屁増加 ※用法は食直前 ※低血糖時はブドウ糖で対応			
NM 3	グルコバイ (アカルボース)	50mg 100mg	1回 200
NM 3	ベイスン (ボグリボース)	0.2mg 0.3mg	1回 0.3
NM 3	セイブル (ミグリトール)	25mg 50mg 75mg	1回 75

BG + TZD			
メタクト配合			
RR 朝		LD	HD
朝	メトホルミン	500mg	500mg
朝	ピオグリタゾン	15mg	30mg

BG			
(ビグアナイド)			
AJ) 腎障害により用量調節が必要、高度腎障害は禁忌			
SE) 下痢、悪心、低血糖、乳酸アシドーシス等 ※開始用量1日500mg、検査の種類により休薬が必要			
禁	メトグルコ	250mg 500mg	成人 2250
2-3	(メトホルミン)		

DNA			
(イメグリミン)			
SE) 悪心、下痢、便秘			
NM 2	ツイミーグ	500mg	2000

GLP 1			
(GLP 1 受容体作動)			
RR) DPP4は併用不可:レセプト査定の恐れ			
SE) 悪心、下痢等 ※開始用量3mg、4週間以上あけて段階的に増量			
RR 起	リベルサス	3mg 7mg 14mg	14
起			
1日の最初の飲食の前に服用する 服用後30分は飲食及び他の薬を経口摂取しない			