

# 上級:問題5

## 模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ テルスケ 患者 全助	間違井 病院 泌尿器科	
年齢	60歳9カ月	男	マチガイ ナイヨ 間違井 無伊代 医師
処方	変更不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。	
		Rp1. トビエース錠4mg 1日1回 夕食後 1錠 28日分  Rp2. 【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg 1日2回 朝夕食後 2錠 28日分  【以下余白】	
備考			このQRコードを 読み取ることで 問題を印刷でき るサイトへ接続 できます。
	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。		
	保険医署名	印	

## 基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	デザレックス:食欲亢進	なし	なし	ナッツ	-

## 今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	25日前	52日前
トビエース錠4mg 夕食後 1回1錠	28日分	-	-
シロドシンOD錠4mg 朝夕食後 1回1錠	28日分	28日分	28日分
ベオーバ錠50mg 夕食後 1回1錠	-	28日分	-
間違井病院 神経内科 間違井寧 医師			
タクロリムスカプセル0.5mg 朝夕食後 1回2カプセル	-	-	56日分
プレドニン錠5mg 朝食後 1回1錠	-	-	56日分
ランソプラゾールOD錠15mg 朝食後 1回1錠	-	-	56日分
エルデカルシトールカプセル0.75 μg 朝食後 1回1カプセル	-	-	56日分
メスチノン錠60mg 朝昼食後 1回1錠	-	-	56日分
バクタ配合錠 朝食後 1回1錠(月水金に服用)	-	-	24日分

## 今回処方の患者の訴え

前回のベオーバ錠では、夜間の排尿回数はあまり変化なく、3回はある。違う薬を試すことになった。尿が出にくいなどあれば、やめるよう聞いている。

## 前回処方(25日前)の薬歴

S : 尿が出にくい感じはない。1回あたりの排尿量が少ないようだ。  
最近、夜間頻尿が多く、3~4回トイレに行くので、新しく薬をもらった。  
O : 継続(前回)+ベオーバ:初回。併用薬あり:神経内科。  
A : ベオーバの追加処方について。  
P : 夕食後の服用で、夜間の排尿回数を減らす効果が期待できます。  
N : ベオーバ追加後、夜間頻尿は減ったか？