


初級:問題4

模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ マサムラ 患者 正村		間違井 病院 小児科
年齢	7歳1ヵ月	男	マチガイ ダロウ 間違井 駄朗 医師
処方	変更不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。	
		Rp1. 【般】カルボシステインシロップ用50% 1.2g 【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5% 1.2g 1日3回 毎食後 7日分	
		Rp2. 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 5mL 1日2回 朝食後・就寝前 30日分	
		Rp3. 【般】ツロブテロールテープ1mg 30枚 1日1回 就寝前に貼付	
		Rp4. 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg 1錠 1日1回 就寝前 30日分	
	【以下余白】		
備考			このQRコードを 読み取ることで 問題を印刷でき るサイトへ接続 できます。
	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。		
	保険医署名	印	

基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	なし	なし	牛乳	小麦	-

今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	45日前	120日前
カルボシステインDS50% 毎食後 1回0.4g【混合】	7日分	-	-
アンブロキシソール塩酸塩DS1.5% 毎食後 1回0.4g【混合】	7日分	-	-
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 朝食後・就寝前 1回2.5mL	30日分	40日分	-
ツロブテロールテープ1mg 1日1回 就寝前に貼付	30枚	7枚	7枚
モンテルカストチュアブル錠5mg 就寝前 1回1錠	30日分	40日分	30日分
カルボシステインDS50% 毎食後 1回0.37g【混合】	-	-	7日分
アンブロキシソール塩酸塩DS1.5% 毎食後 1回0.37g【混合】	-	-	7日分
アセトアミノフェン細粒20% 発熱時 1回0.9g	-	-	5日分

今回処方の患者の訴え

咳がひどくなり、痰切りなどが追加になりました。薬、毎日飲めています。体重は20kgです。ツロブテロールテープは毎日使用するよう言われた。

前回処方(45日前)の薬歴

- S : 咳が出てきたので、モンテルカストを再開することになった。
鼻水も出ている。テープは咳が落ち着いたらやめてもいいと聞いた。
- O : 新規、モンテルカスト:再開、レボセチリジン:初回。
ツロブテロールテープ:咳改善次第終了。併用薬なし。
- A : 継続服用の必要性について。
- P : 症状が改善しても内服薬はいずれも再燃予防として継続すること。
ツロブテロールテープは医師の指示どおり、改善するまでOKです。
- N : 咳症状経過。継続しているか？