

中級:問題1

模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ 患者	コウベエ 高兵衛	間違井 病院 内科
年齢	58歳7カ月	男	マチガイ スギタ 間違井 杉太 医師
変更 不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。		
処 方	Rp1.		
	ジャディアン錠10mg イニシンク配合錠 【般】グリメピリド錠1mg 【般】イルアミクス配合錠HD 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg 【般】ロスバスタチン錠5mg リベルサス錠3mg 1日1回 朝食後	1錠 1錠 0.5錠 1錠 1錠 1錠 1錠	14日分
	Rp2.		
	ベルソムラ錠15mg 1日1回 就寝前	1錠	14日分
	【以下余白】		
備 考			このQRコードを 読み取ることで 問題を印刷でき るサイトへ接続 できます。
	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。		
	保険医署名	印	

基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	セレコキシブ:薬疹	車の運転	アルコール	スギ花粉	-

今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	32日前	65日前
ジャディアンス錠10mg 朝食後 1回1錠	14日分	30日分	30日分
イニシンク配合錠 朝食後 1回1錠	14日分	30日分	30日分
グリメピリド錠1mg 朝食後 1回0.5錠	14日分	30日分	30日分
イルアミクス配合錠HD 朝食後 1回1錠	14日分	30日分	30日分
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg 朝食後 1回1錠	14日分	30日分	30日分
ロスバスタチン錠5mg 朝食後 1回1錠	14日分	30日分	30日分
リベルサス錠3mg 朝食後 1回1錠	14日分	-	-
ベルソムラ錠15mg 就寝前 1回1錠	14日分	-	-
ヒドロクロチアジド錠12.5mg 朝食後 1回1錠	-	-	30日分

今回処方の患者の訴え

HbA1cが高いままなので、新しい糖尿病薬を追加すると聞いた。
 血圧は落ち着いている。寝付きが悪く、睡眠薬が追加となり、寝酒は控える。

前回処方(32日前)の薬歴

S : 血圧は下がってきたので、利尿剤はなくなります。
 血糖値は高いままで、HbA1cは8をなかなか切らない。
 O : 継続(前回)ーヒドロクロチアジド:終了。BP:115-82。併用薬なし。
 A : 降圧薬の減薬及び糖尿病における指導。
 P : 今回から利尿剤がなくなります。しばらくは血圧変動に注意してください。
 糖尿病は、簡単な運動習慣をつけることから始めてみる。
 1日10分でもいいので、隙間時間で体を動かすようにしてください。
 N : 利尿剤減薬後、血圧は上がっていないか？