

中級:問題10

模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ ツグカツ 患者 次勝	間違井 病院 皮膚科
年齢	59歳1ヵ月	男 マチガイ オオスギ 間違井 大杉 医師
変更 不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。	
	処方	<p>Rp1. プレドニン錠5mg 2錠 【般】ファモチジン錠20mg 1錠 1日1回 朝食後 5日分</p> <p>Rp2. 【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg 2錠 1日2回 朝食後・就寝前 5日分</p> <p style="text-align:center">【以下余白】</p>
備考	このQRコードを読み取ることで問題を印刷できるサイトへ接続できます。	
	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。	保険医署名 印



基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	なし	なし	牛乳	金属	-

今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	5日前	30日前
プレドニン錠5mg 朝食後 1回2錠	5日分	-	-
ファモチジン錠20mg 朝食後 1回1錠	5日分	5日分	-
オロパタジン塩酸塩錠5mg 朝食後・就寝前 1回1錠	5日分	5日分	-
プレドニン錠5mg 朝食後 1回3錠	-	5日分	-
間違井病院 内科 間違井杉太 医師			
アマルエット配合錠4番 朝食後 1回1錠	-	-	56日分
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg 朝食後 1回1錠	-	-	56日分
フェブキソスタット錠10mg 朝食後 1回1錠	-	-	56日分
キャブピリン配合錠 朝食後 1回1錠	-	-	56日分
スー ज्याヌ配合錠 朝食後 1回1錠	-	-	56日分

今回処方の患者の訴え

症状は改善してきた。プレドニンを少しずつ減らしていくと聞いている。
胸やけや眠気はありませんでした。薬は特に問題なく飲めています。

前回処方(5日前)の薬歴

S : 全身のあちこちに水膨れのような発疹ができて、痒みもある。
O : 新規、初回。併用薬あり: 内科。
A : プレドニン及びオロパタジンの副作用について。
P : プレドニンは胃を荒らす恐れがあるので、必ず食後に服用してください。
オロパタジンは眠気を伴う恐れがあるので、しばらく注意してください。
N : 副作用: 胸やけ、眠気の確認