

上級:問題7

模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ タサイ 患者 多才		間違井 病院 内科
年齢	46歳9カ月	男	マチガイ スギタ 間違井 杉太 医師
変更 不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。		
	処 方	<p>Rp1.</p> <p>【般】テルチア配合錠AP 1錠</p> <p>【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg 1錠</p> <p>トラゼンタ錠5mg 1錠</p> <p>【般】エゼチミブ錠10mg 2錠</p> <p>1日1回 朝食後 30日分</p> <p>Rp2.</p> <p>【般】エチゾラム錠0.5mg 1錠</p> <p>1日1回 就寝前 15日分</p> <p style="text-align: center;">【以下余白】</p>	
備 考		0410対応	
	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。		
	保険医署名	印	



基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	スタチン:筋肉痛	なし	なし	なし	-

今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	5日前	30日前
テルチア配合錠AP 朝食後 1回1錠	30日分	-	30日分
アムロジピンOD錠5mg 朝食後 1回1錠	30日分	-	30日分
トラゼンタ錠5mg 朝食後 1回1錠	30日分	-	30日分
エゼチミブ錠10mg 朝食後 1回2錠	30日分	-	30日分
エチゾラム錠0.5mg 就寝前 1回1錠	15日分	-	20日分
間違井病院 皮膚科 間違井大杉 医師			
ビラノア錠20mg 就寝前 1回1錠	-	7日分	-
マイザー軟膏0.05% 1日2回 手に塗布	-	10g	-
ロコイド軟膏0.1% 1日2回 額に塗布	-	10g	-

今回処方の患者の訴え

前回、テルチアの服用を開始してから血圧は下がってきました。
今日はオンライン受診で継続処方です。顔や手の赤みはまだ続いている。

前回処方(5日前)の薬歴

S : 額や手の甲が赤くなっている。日光過敏かもと言われた。
O : 新規、服用歴なし、使用歴あり。併用薬あり:内科。
A : ビラノアの服用及びステロイド外用薬の塗布について。
P : ビラノアは食後に服用すると効果が落ちる恐れがあります。
ステロイドは2種類の強さが違うので、部位に応じて使い分けてください。
N : 額や手の甲の赤みは経過どうか？