

PG関連 (プロスタグランジン)

RR) エイベリス
タフルプロストは併用禁忌
白内障等の手術歴の確認

SE) 結膜充血・色素沈着・まつ毛異常(濃くなる等)
洗顔前又は入浴前の点眼を推奨する
※エイベリスはPG特有のSEを生じない

禁 エイベリス 0.002% ミニ

RR 1

キサラタン 0.005%
(ラタノプロスト)

禁 タプロス 0.0015% ミニ

NM 1

トラバタンズ 0.004%
(トラボプロスト)

NM 1

ルミガン 0.03%
(ビマトプロスト)

NM 1

レスキュラ 0.12%
(イソプロピルウノプロストン)

NM 2

PG+β遮断

禁 ザラカム配合

RR 1 (GE)ラタチモ

ラタノプロスト	50μg
チモロール	5mg

禁 タプコム配合

RR 1

タフルプロスト	15μg
チモロール	5mg

禁 デュオトラバ配合

RR 1 (GE)トラチモ

トラボプロスト	40μg
チモロール	5mg

禁 ミケルナ配合

RR 1

ラタノプロスト	50μg
カルテオロール	20mg

α₃遮断

RR) 気管支喘息は疾患禁忌:
治療薬の使用又は既往歴
※その他: 重篤なCOPD等禁忌あり

SE) 呼吸器関連(喘息、COPDなど)の悪化
循環器関連(心不全、徐脈性の不整脈)の悪化

禁 ハイパジール
ニプラノール 0.25%
(ニプラジロール)

RR 2

交感神経刺激

SE) 結膜充血・眼痛
※散瞳効果あり

禁 ピバレフリン 0.04%
0.1%

NM 1-2

α₁遮断

デタントール 0.01%

NM 2

副交感神経刺激

※縮瞳効果あり

禁 サンピロ 0.5% 2% 4%
1% 3%

NM 3-5

ROCK 阻害

SE) 結膜充血

グラナテック 0.4%

NM 2

β遮断

RR) 気管支喘息は疾患禁忌:
治療薬の使用又は既往歴
※その他: 重篤なCOPD等禁忌あり

SE) 呼吸器関連(喘息、COPDなど)の悪化
循環器関連(心不全、徐脈性の不整脈)の悪化
※1日1回製剤は10分以上の間隔をあげ最後に点眼

禁 チモプトール 0.25%
0.5%

RR 2 (チモロールマレイン酸塩)

禁 チモプトール XE 0.25%
0.5%

RR 1 (チモロールマレイン酸塩)

禁 リズモン TG 0.25%
0.5%

RR 1 (チモロールマレイン酸塩)

禁 ミケラン 1%
2%

RR 2 (カルテオロール塩酸塩)

禁 ミケラン LA 1%
2%

RR 1 (カルテオロール塩酸塩)

禁 レボブノロール 0.5%

RR 1-2 (レボブノロール塩酸塩)

β遮断+CAI

禁 コソプト配合 ミニ

RR 2 (GE)ドルモロール

ドルゾラミド	10mg
チモロール	5mg

禁 アゾルガ配合懸濁性

ブリンゾラミド	10mg
チモロール	5mg

RR 2

β遮断+α₂作動

禁 アイベータ配合

RR 2

ブリモニジン	1mg
チモロール	5mg

α₂作動

※年齢が2才未満は禁忌

禁 アイファガン 0.1%

NM 2 (ブリモニジン酒石酸塩)

CAI+α₂作動

禁 アイラミド配合

2

ブリモニジン	1mg
ブリンゾラミド	10mg

CAI (炭酸脱水酵素阻害)

AJ) 高度腎障害は禁忌

SE) トルソプト: 眼刺激感(しみる、異物感など)
エイゾプト: 味覚異常(苦味)
※懸濁性は10分以上の間隔をあげ最後に点眼

禁 トルソプト 0.5%
0.1%

3

禁 エイゾプト懸濁性 1%
(ブリンゾラミド)

2-3