

**A2A**  
(アデノシンA<sub>2A</sub>受容体拮抗薬)

※高度肝障害は禁忌  
※ウェアリング・オフの改善  
※レボドパ含有製剤と併用する

**禁** ノウリアスト

NM 1

20mg

× 40 ※中等度肝障害患者またはCYP3A4強阻害薬併用時  
上限用量20mg

**DOPA-R**  
(ドパミン遊離促進薬)

AJ) 腎障害により用量調節が必要。透析中は禁忌  
※ジスキネジア、すくみ足の改善

**禁** シンメトレル

1-3

細 10%  
50mg  
100mg

× 300 ※適応症により  
用法用量が異なる

(アマンタジン)

**L-DOPA**  
(レボドパ含有製剤)

※閉塞隅角緑内障は疾患禁忌

※パーキンソン病治療薬の主役  
SE) 悪心

**禁** ネオドパストン

NM 3

(50mg)  
100mg  
250mg

○ 1500

**禁** マドパー

NM 1-3

○ 12  
※マドパーは  
粉碎不可

(レボドパ・カルビドパ)

(レボドパ・ベンセラジド)

**新DA**  
(非麦角系ドパミン作動薬)

RR) 自動車運転等危険を伴う作業の従事は不可  
AJ) 腎障害により用量調節が必要  
徐放：高度肝障害は禁忌

※レボドパ含有製剤に比べて、効果は弱い。作用時間が長い  
気分障害(うつ)に効果を示す可能性がある  
SE) 眠気、幻覚、悪心

**ビ・シフロール**

RR 2-3

0.125mg  
0.5mg

○ 4.5  
※適応症により  
用法用量が異なる

**禁** ミラベックスLA

RR 1

0.375mg  
1.5mg

× 4.5

(プラミペキソール徐放)

**レキップ**

RR 3

0.25mg  
1mg  
2mg

○ 15

(ロピニロール)

**レキップCR**

RR 1

2mg  
8mg

× 16

(ロピニロール徐放)

**ハルロピテープ**

RR 1

8mg  
16mg  
24mg  
32mg  
40mg

64

ロピニロールのパッチ剤

**ニュープロパッチ**


RR 1

2.25mg  
4.5mg  
9mg  
13.5mg  
18mg

36  
※適応症により  
用法用量が異なる

※すくみ足  
動作を開始する時にその動作が止まってしまふ現象  
例) 歩こうとしたが歩けない  
方向転換がしづらい  
目を開けにくい など

※ジスキネジア  
自分の意思とは関係なく体の一部が勝手に不規則におかしな動きをする現象。薬が効きすぎると起こることがある。  
例) 口をもぐもぐさせる  
勝手に手が動いてしまう など



※ウェアリング・オフ  
薬の効果が切れて、動きづらくなる現象。  
例) 体が動きにくくなる  
ふるえが出る  
暗い気分になる など

**NA**  
(ノルアドレナリン前駆物質)

※閉塞隅角緑内障は疾患禁忌  
※カテコラミン製剤は併用禁忌  
(イソメニール、プロタノール等)

※すくみ足、立ちくらみの改善  
SE) 頭重感、悪心、血圧上昇

**禁** ドプス

NM 1-3

細 20%  
100mg  
200mg

○ 900  
※適応症により  
用法用量が異なる

(ドロキシドパ)

**ZNS**  
(ドパミン代謝阻害薬)

※ウェアリング・オフの改善  
※レボドパ含有製剤と併用する  
SE) 眠気、食欲不振

**禁** トレリーフ

NM 1

25mg  
50mg

○ 50  
※適応症により  
用法用量が異なる

※抗てんかん薬であるエクセグラン(ゾニサミド：同一成分)が適応外でパーキンソン病に処方されることがある

**MAO**  
(MAO-B阻害薬)

※併用禁忌等が多い。必ず添付文書を確認する  
アジレクト：中等度以上肝障害は禁忌  
エクフィナ：高度肝障害は禁忌

※ウェアリング・オフ時間の短縮  
エクフィナ：レボドパ含有製剤と併用する

**禁** エフピー

DG 1-2

2.5mg

○ 10  
※セレギリン(GE)は  
粉碎不可

(セレギリン)

**禁** アジレクト

DG 1

0.5mg  
1mg

○ 1

**禁** エクフィナ

DG 1

50mg

○ 100  
※中等度肝障害患者は  
上限用量50mg

**L-DOPA + COMT**

**禁** スタレボ配合

NM 1-8

L50 L100  
レボドパ・カルビドパ 50mg 100mg  
エンタカポン 100mg 100mg

**COMT**  
(末梢COMT阻害薬)

※悪性症候群、横紋筋融解症の既往歴がある患者は疾患禁忌  
※オンジェンティス：高度肝障害は禁忌

※ウェアリング・オフの改善  
※レボドパ含有製剤と併用する  
SE) コムタン：着色尿

**禁** コムタン

NM 1-8

100mg

○ 200 1600  
1回 1日

(エンタカポン)

**禁** オンジェンティス

NM 1

25mg

? 25

レボドパ含有製剤の服用前後及び食事の前後1時間以上はあける(就寝前が多い)

**抗コリン**  
(抗コリン薬)

※閉塞隅角緑内障、重症筋無力症は疾患禁忌

※振戦に有効。高齢者には不向き  
SE) 口渇、便秘、排尿障害

**禁** アーテン

NM 3-4

散 1%  
2mg

○ 10

(トリヘキシフェニジル)

**禁** アキネトン

NM 2

散 1%  
1mg

○ 6

(ビペリデン)

**IBDA**  
(麦角系ドパミン作動薬)

※心臓弁膜症等の既往歴がある患者は疾患禁忌  
(心エコー検査を定期的に行う必要がある)

※ベルマックス：レボドパ含有製剤と併用する  
SE) 悪心

**禁** カバサール

NM 朝

0.25mg  
1mg

○ 3  
※適応症により  
用法用量が異なる

(カベルゴリン)

**禁** パーロデル

NM 1-3

2.5mg

○ 22.5  
※適応症により  
用法用量が異なる

(ブロモクリプチン)

**禁** ペルマックス

NM 1-3

50μg  
250μg

× 1250

(ペルゴリド)