

**PG関連** (プロスタグランジン) RR) エイベリス  
タフルプロストは併用禁忌  
白内障等の手術歴の確認

SE) 結膜充血・色素沈着・まつ毛異常(濃くなる等)  
洗顔前又は入浴前の点眼を推奨する  
※エイベリスはPG特有のSEを生じない

**禁** エイベリス 0.002% ミニ

RR 1

キサラタン 0.005%  
(ラタノプロスト)

**禁** タプロス 0.0015% ミニ

NM 1

トラバタンズ 0.004%  
(トラボプロスト)

NM 1

ルミガン 0.03%  
(ビマトプロスト)

NM 1

レスキュラ 0.12%  
(イソプロピルウノプロストン)

NM 2

**PG+β遮断**

**禁** ザラカム配合

RR 1 (GE)ラタチモ

ラタノプロスト	50μg
チモロール	5mg

**禁** タプコム配合

RR 1

タフルプロスト	15μg
チモロール	5mg

**禁** デュオトラバ配合

RR 1 (GE)トラチモ

トラボプロスト	40μg
チモロール	5mg

**禁** ミケルナ配合

RR 1

ラタノプロスト	50μg
カルテオロール	20mg

**α<sub>2</sub>遮断** RR) 気管支喘息は疾患禁忌:  
治療薬の使用又は既往歴  
※その他: 重篤なCOPD等禁忌あり

SE) 呼吸器関連(喘息、COPDなど)の悪化  
循環器関連(心不全、徐脈性の不整脈)の悪化

**禁** ハイパジール  
ニプラノール 0.25%  
(ニプラジロール)

RR 2

**交感神経刺激** SE) 結膜充血・眼痛  
※散瞳効果あり

**禁** ピバレフリン 0.04%  
0.1%

NM 1-2

**α<sub>1</sub>遮断**

デタントール 0.01%

NM 2

**副交感神経刺激** ※縮瞳効果あり

**禁** サンピロ 0.5% 2% 4%  
1% 3%

NM 3-5

**ROCK 阻害** SE) 結膜充血

グラナテック 0.4%

NM 2

**β遮断** RR) 気管支喘息は疾患禁忌:  
治療薬の使用又は既往歴  
※その他: 重篤なCOPD等禁忌あり

SE) 呼吸器関連(喘息、COPDなど)の悪化  
循環器関連(心不全、徐脈性の不整脈)の悪化  
※1日1回製剤は10分以上の間隔をあけ最後に点眼

**禁** チモプトール 0.25%  
0.5%

RR 2 (チモロールマレイン酸塩)

**禁** チモプトール XE 0.25%  
0.5%

RR 1 (チモロールマレイン酸塩)

**禁** リズモン TG 0.25%  
0.5%

RR 1 (チモロールマレイン酸塩)

**禁** ミケラン 1%  
2%

RR 2 (カルテオロール塩酸塩)

**禁** ミケラン LA 1%  
2%

RR 1 (カルテオロール塩酸塩)

**禁** レボブノロール 0.5%

RR 1-2 (レボブノロール塩酸塩)

**β遮断+α<sub>2</sub>作動**

**禁** アイベータ配合

RR 2

ブリモニジン	1mg
チモロール	5mg

**ROCK+α<sub>2</sub>作動**

**禁** グラアルファ配合

NM 2

ブリモニジン	1mg
リパスジル	4mg

**β遮断+CAI**

**禁** コソプト配合 ミニ

RR 2 (GE)ドルモロール

ドルゾラミド	10mg
チモロール	5mg

**禁** アゾルガ配合懸濁性

RR 2

布林ゾラミド	10mg
チモロール	5mg

**CAI** (炭酸脱水酵素阻害) AJ) 高度腎障害は禁忌

SE) トルソプト: 眼刺激感(しみる、異物感など)  
エイゾプト: 味覚異常(苦味)  
※懸濁性は10分以上の間隔をあけ最後に点眼

**禁** トルソプト 0.5%  
0.1%

3 AJ

**禁** エイゾプト懸濁性 1%  
(布林ゾラミド)

2-3 AJ

**CAI+α<sub>2</sub>作動**

**禁** アイラミド配合

2 AJ

ブリモニジン	1mg
布林ゾラミド	10mg

**α<sub>2</sub>作動** ※年齢が2才未満は禁忌

**禁** アイファガン 0.1%  
(ブリモニジン酒石酸塩)

NM 2